

## ISTRUZIONI PER L'OCCLUSIONE NELL'AMBLIOPIA

L'**ambliopia** (meglio conosciuta come occhio pigro) è una malattia per cui si ha una diminuzione dell'**acuità visiva** (capacità visiva) di un occhio, non correggibile con l'occhiale.

Le cause più frequenti di ambliopia sono:

- strabismo;
- differenza di difetto di vista tra un occhio e l'altro;
- anomalie dalla nascita (abbassamento della palpebra (ptosi) o cataratta).

Il trattamento dell'ambliopia è possibile in tanti casi con l'**OCCLUSIONE** (copertura) dell'occhio "sano", per stimolare la fissazione e la visione dell'occhio ambliope (che ci vede meno). Solo in questo modo il bambino potrà vedere di nuovo molto bene (addirittura 10 decimi) con tutti e due gli occhi.

In caso di ambliopia è molto importante seguire le indicazioni ricevute per fare dell'occlusione; la chiusura dell'occhio tutti i giorni può portare a risultati ottimi, ma solamente se eseguita quando il bambino è ancora piccolo, ossia prima dei 7-8 anni di vita. Dopo questa età il sistema visivo è del tutto sviluppato e non ci sono più miglioramenti.

Il cerotto (occlusione) va messo sull'occhio tutti i giorni per il numero di ore consigliato e quando il bambino fa attività che stimolano la vista, come giocare, guardare la televisione o mentre è a scuola. **NON** mettere il cerotto mentre il bambino dorme, perché inutile.

Molto importante è anche non interrompere la terapia per qualche settimana o mese, perché può succedere che l'occhio torni in poco tempo a vedere male come prima.

**Per domande o spiegazioni si rivolga a [info@aiorao.it](mailto:info@aiorao.it)**